



Agrenda B5|27

ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 & ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ



ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΑΝΘΩΝ



60 - 90
ΕΚΑΤΟΣΤΑ

20 - 40
ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

Σε ανοδική πορεία τα σταυρανθή

Με όλο και μεγαλύτερη συχνότητα βρίσκουν θέση στο τραπέζι του μέσου καταναλωτή τα σταυρανθή, καθώς οι διατροφολόγοι τα συνιστούν και οι κουζίνες ζητούν τα πλούσια σε φολικό οξύ και βιταμίνες πράσινα λαχανικά. Ο σύγχρονος τρόπος καλλιέργειας σε θερμοκήπια κλειστού τύπου, απαιτεί την αξιοποίηση της τελευταίας λέξης στην αγροτεχνολογία, με υβρίδια υψηλών αποδόσεων που δίνουν ένα προϊόν με υψηλή περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία. Ένα υψηλής ποιότητας λαχανικό απαιτεί βέβαια την κατάλληλη αγρονομική υποστήριξη, με ελεγχόμενη και ακριβή εφαρμογή θρέψης.

Humocall®

Για όλες τις καλλιέργειες
ΟΡΓΑΝΟΧΟΥΜΙΚΟ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ
ΑΠΟ ΚΟΠΡΙΑ ΟΡΝΙΩΝ

Humobio®

Για τις βιολογικές καλλιέργειες
ΟΡΓΑΝΟΧΟΥΜΙΚΟ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ
ΑΠΟ ΚΟΠΡΙΑ ΟΡΝΙΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΤΡΟΦΩΝ

ΑΝΑΝΕΩΣΤΕ ΤΗ ΓΗ ΣΑΣ



Μπορείτε να καλύψετε τις ανάγκες του εδάφους που καλλιεργείτε και να του προσφέρετε την καλύτερη βοήθεια, για να ανα νεωθεί και να γίνει πιο παραγωγικό



Σκούρτης

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧ ΕΙΡΗΣΕΩΝ

Π.ΣΚΟΥΡΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Τ.Κ. 20008 ΤΗΛ: +30 2741 098 227 FAX: +30 2741 098 484 ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ +30 213 0084 530 www.bioskourtis.gr e-mail: info@bio-skourtis.gr



ΠΟΤΙΣΜΑΤΑ

ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ

Τα λαχανικά απαιτούν νερό χωρίς πολλά άλατα, ενώ το έδαφος θα πρέπει να μην είναι υπερβολικά υγρό, καθώς η υπερβολική υγρασία μπορεί να οδηγήσει σε σάπισμα των ριζών αλλά και να ευνοήσει την ανάπτυξη ασθενειών. Ο ιδανικός τρόπος ποτίσματος είναι η στάγδην άρδευση (σύστημα σταγόνας), ώστε το φυτό να παίρνει μόνο το νερό που χρειάζεται, χωρίς να βρέχονται τα φύλλα και οι καρποί των λαχανικών και προστατεύονται από μετάδοση εκθρών και ασθενειών αλλά και από εγκαύματα. Το πότισμα πρέπει να γίνεται νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα έτσι ώστε το νερό να μην εξατμίζεται από τον ήλιο.

ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΦΥΤΕΥΣΗ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ ΓΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

> **Μετά το όργωμα ή το φρεζάρισμα**, η ενσωμάτωση οργανικής ουσίας και η βασική λίπανση βάζουν τις βάσεις για μια αποδοτική καλλιέργεια

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ

Με την προετοιμασία του εδάφους για την εγκατάσταση των φυτών ξεκινούν αυτόν τον μήνα οι καλλιεργητικές φροντίδες για τη φύτευση των χειμερινών λαχανικών (λάχανο, μπρόκολο, κουνουπίδι, μαρούλι, σπανάκι κ.α.), που συγκομίζονται μέσα στον χειμώνα. Από την ορθή προετοιμασία του χωραφιού μέχρι τη σωστή θρέψη, οι παραγωγοί θέτουν τώρα τις βάσεις για μια ποιοτική και αποδοτική συγκομιδή. Πρώτο και σημαντικό βήμα είναι η σωστή προετοιμασία του εδάφους. Ένα βαθύ όργωμα ή φρεζάρισμα βοηθάει στον αερισμό του χώματος και στην καλύτερη στράγγιση. Πιο συγκεκριμένα, οι απαραίτητες εργασίες για την προετοιμασία του εδάφους είναι:

- Απομάκρυνση πετρών και άλλων ανεπιθύμητων αντικειμένων από το έδαφος.
- Σε περίπτωση ανομοιομορφίας του εδάφους, πρέπει να γίνεται ισοπέδωση (ιδιαίτερα όταν το πότισμα γίνεται σε αυλάκια), με κλίση 2% προς την κατεύθυνση των υδρορροών.
- Δύο ή περισσότερα σταυρωτά οργώματα σε βάθος 30-40 cm. Σε περίπτωση που το υπέδαφος είναι φτωχό, το όργωμα γίνεται σε μικρότερο βάθος ώστε να μην μεταφερθεί στην επιφάνεια το υπέδαφος. Ακολουθεί το σβάρνισμα με δισκοσβάρνα ή οδοντωτή σβάρνα ή φρεζάρισμα (10-15 cm), όταν το έδαφος βρίσκεται στο ρώγο του, με σκοπό το ψιλοχωμάτισμα, την ενσωμάτωση της χωνεμένης κοπριάς και των βασικών λιπασμάτων.
- Κατασκευή στραγγιστικού δικτύου με σωλήνες ή χαντάκια βάθους 60-90 cm.
- Καταστροφή ζιζανίων.
- Διαχωρισμός και διαμόρφωση του αγρού για την εγκατάσταση των φυτών.

Βασική λίπανση

Μετά το όργωμα ή το φρεζάρισμα, η ενσωμάτωση οργανικής ουσίας αποτελεί το πρώτο βήμα. Η κοπριά, το κομπόστ ή τα πράσινα λιπάσματα βελτιώνουν τη δομή του εδάφους, αυξάνουν τη γονιμότητα και βοηθούν στη συγκράτηση υγρασίας.

■ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΖΩΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ

ΛΑΧΑΝΟ

12-15 kg



ΜΠΡΟΚΟΛΟ

10-13 kg



ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ

10-12 kg



ΜΑΡΟΥΛΙ

8-10 kg



Παράλληλα, είναι απαραίτητη η βασική λίπανση με φωσφόρο και κάλιο, καθώς αυτά τα στοιχεία υποστηρίζουν την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και την ανθεκτικότητα των φυτών στο κρύο.

Αζωτούχος λίπανση σε δύο ή τρεις δόσεις

Το άζωτο είναι βασικό στοιχείο για τα φυλλώδη λαχανικά, όπως μαρούλι, σπανάκι, λάχανο και μπρόκολο. Η χορήγησή του όμως πρέπει να γίνεται τμηματικά, σε δύο ή τρεις δόσεις, ώστε να αποφευχθεί η υπερβολική βλάστηση και η ευπάθεια σε ασθένειες. Στην πράξη, οι παραγωγοί προχωρούν σε μια δόση με τη μεταφύτευση και ακολουθούν επαναληπτικές λιπάνσεις (επιφανειακές) ανάλογα με τις ανάγκες της καλλιέργειας και τον καιρό.

Ασβέστιο για να μην «καίγονται» οι κορυφές

Εξίσου σημαντική είναι και η παροχή ιχνοστοιχείων, όπως βόριο, μαγνήσιο και ασβέστιο. Το ασβέστιο συμβάλλει στη σκληρότητα των ιστών και μειώνει προβλήματα όπως το «κάψιμο» στην κορυφή του μπρόκολου ή την ξηρή κορυφή στο κουνουπίδι, ενώ το βόριο βοηθά στη σωστή ανάπτυξη της κεφαλής του λάχανου και στην ποιότητα της σοδειάς. Οι εφαρμογές μπορεί να γίνονται με κοκκώδη λιπάσματα είτε με διαφυλλικούς ψεκασμούς.